

Wskazówki dla pacjenta wypisanego ze szpitala z workiem zbiorczym na mocz – ZAŁĄCZNIK nr 1

Opróżnianie i wymiana worka zbiorczego

1. Umyć i zdezynfekować ręce.
 2. Nałożyć rękawiczki jednorazowe.
 3. Otworzyć zacisk- nie dotykać końcówki palcami.
 4. Po opróżnieniu worka przetrzeć końcówkę gazikiem nasączonym odpowiednim antyseptykiem (środek do dezynfekcji skóry, spirytus salicylowy itp.), a następnie zamknąć zacisk.
 5. Przy wymianie worka zbiorczego, po odłączeniu cewnika od worka należy końcówkę cewnika zdezynfekować, a następnie podłączyć nowy worek zbiorczy.
 6. Zdjąć rękawiczki, umyć i zdezynfekować ręce.
 7. Niepokojące objawy:
 - przez ponad 4 godziny nie stwierdzono pojawienia się moczu w worku zbiorczym,
 - uczucie pełnego pęcherza, ból w podbrzuszu,
 - ból w miejscu wprowadzenia cewnika,
 - z miejsca wprowadzenia cewnika wycieka ropa lub wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach,
 - mocz zmienił kolor, gęstość lub w moczu zaobserwowano krew,
 - gorączka, dreszcze,
 - cewnik wyraźnie jest dłuższy i nie toczy moczu.
- Należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.