

Wskazówki dla pacjenta wypisanego ze szpitala po zabiegu STULEJKI

1. Unikać wzmożonego wysiłku fizycznego przez okres 2-3 tygodnie, nie wolno dźwigać.
2. Ograniczyć aktywność do codziennych czynności.
3. Rozpocząć współżycie nie wcześniej niż 4 tygodnie po operacji.
4. Istotna jest higiena – kąpiel pod prysznicem, myć prącie mydłem, naparem z rumianku.
5. Przed wykonaniem opatrunku umyć ręce w ciepłej wodzie z mydłem.
6. Ranę należy przemyć octeniseptem, poczekać aż wyschnie, nałożyć maść z antybiotykiem (jeżeli był zalecony), nałożyć jałowy opatrunek (gazik).
7. Podczas snu ułożyć prącie na rulonie z gazu lub bandaża – co przeciwdziała opuchnięciu.
8. Jeżeli zauważysz krwawienie – ucisnąć miejsce krwawienia gazikiem.
9. Dalsze postępowanie według zaleceń w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

UWAGA!

W przypadku niepokojących objawów takich jak ból, krwawienie są mocno nasilone należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub poradni urologicznej.